

SCHUTZLOS?

VEREINFACHTER IMPFKALENDER
der „Ständigen Impfkommision (STIKO)“
für Säuglinge, Kinder und Jugendliche
bei Verwendung von bis zu Sechsfach-Impfstoffen
Stand: Stiko Januar 2025

Impfung gegen:	Empfohlenes Impf-Alter							
	vollendeter Lebensmonat					vollendetes Lebensjahr		
	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	9-17
Diphtherie	●	●	●	●	●		●	●
Tetanus	●	●	●	●	●		●	●
Keuchhusten (Pertussis)	●	●	●	●	●		●	●
Hämophilus influenzae Typ b (Hib)	●	●	●	●	●			
Kinderlähmung (Polio)	●	●	●	●	●			●
Gelbsucht (Hepatitis B)	●	●	●	●	●			
Pneumokokken	●	●	●	●	●			
Meningokokken B	●		●	● ¹			●	
Meningokokken C				● ²			●	
Masern-Mumps-Röteln				●	●		●	
Windpocken (Varizellen)				●	●		●	
HPV (Humane Papillomviren)								● ³
Rotaviren	[im Alter von 6 Wochen bis zur vollendeten 12. Lebenswoche 2 bis 3 Impfdosen in Abhängigkeit vom verwendeten Impfstoff]							
Respiratorische Synzital Virus (RSV)	[1 Impfdosis für Neugeborene Geburtsmonat April bis September = Impfung im Herbst - Geburtsmonat Oktober bis März = Impfung kurz nach der Geburt]							

- Grundimmunisierung
- Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfung
- Nachholimpfung (Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie.)

¹ 6 Monate Mindestabstand zur 2. Impfung

² ab vollendetem 12. Monat

³ Standardimpfung mit 2 Dosen für Jungen und Mädchen von 9 bis 14 Jahren, bei Nachholen der Impfung mit 3 Dosen