

# SCHUTZLOS?

VEREINFACHTER IMPFKALENDER  
der „Ständigen Impfkommission (STIKO)“  
für Säuglinge, Kinder und Jugendliche  
bei Verwendung von bis zu Sechsfach-Impfstoffen  
Stand: Stiko Januar 2025

Impfung gegen:	Empfohlenes Impf-Alter								
	vollendeter Lebensmonat					vollendetes Lebensjahr			
	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	9-17	
Diphtherie	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tetanus	●	●	●	●	●	●	●	●	
Keuchhusten (Pertussis)	●	●	●	●	●	●	●	●	
Hämophilus influenzae Typ b (Hib)	●	●	●	●	●				
Kinderlähmung (Polio)	●	●	●	●	●			●	
Gelbsucht (Hepatitis B)	●	●	●	●	●				
Pneumokokken	●	●	●	●	●				
Meningokokken B	●		●	● <sup>1</sup>			●		
Meningokokken C				● <sup>2</sup>			●		
Masern-Mumps-Röteln				●	●		●		
Windpocken (Varizellen)				●	●		●		
HPV (Humane Papillomviren)								● <sup>3</sup>	
Rotaviren	[im Alter von 6 Wochen bis zur vollendeten 12. Lebenswoche 2 bis 3 Impfdosen in Abhängigkeit vom verwendeten Impfstoff]								
Respiratorische Synzitial Virus (RSV)	[1 Impfdosis für Neugeborene   Geburtsmonat April bis September = Impfung im Herbst - Geburtsmonat Oktober bis März = Impfung kurz nach der Geburt]								

- Grundimmunisierung
- Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfung
- Nachholimpfung (Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie.)

<sup>1</sup> 6 Monate Mindestabstand zur 2. Impfung

<sup>2</sup> ab vollendetem 12. Monat

<sup>3</sup> Standardimpfung mit 2 Dosen für Jungen und Mädchen von 9 bis 14 Jahren, bei Nachholen der Impfung mit 3 Dosen