

# SCHUTZLOS?

**VEREINFACHTER IMPFKALENDER**  
der „Ständigen Impfkommission (STIKO)“  
für Säuglinge, Kinder und Jugendliche  
bei Verwendung von bis zu Sechs-fach-Impfstoffen  
Stand: Stiko Januar 2025

Impfung gegen:	Empfohlenes Impf-Alter								
	vollendeter Lebensmonat					vollendetes Lebensjahr			
	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	9-17	
Diphtherie	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tetanus	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Keuchhusten (Pertussis)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hämophilus influenzae Typ b (Hib)	●	●	●	●	●	●	●		
Kinderlähmung (Polio)	●	●	●	●	●	●		●	
Gelbsucht (Hepatitis B)	●	●	●	●	●	●			
Pneumokokken	●	●	●	●	●	●			
Meningokokken B	●		●	● <sup>1</sup>			●		
Meningokokken C				● <sup>2</sup>			●		
Masern-Mumps-Röteln				●	●		●		
Windpocken (Varizellen)				●	●		●		
HPV (Humane Papillomviren)									● <sup>3</sup>
Rotaviren	[im Alter von 6 Wochen bis zur vollendeten 12. Lebenswoche 2 bis 3 Impfdosen in Abhängigkeit vom verwendeten Impfstoff]								
Respiratorische Synzitial Virus (RSV)	[1 Impfdosis für Neugeborene   Geburtsmonat April bis September = Impfung im Herbst - Geburtsmonat Oktober bis März = Impfung kurz nach der Geburt]								

- Grundimmunisierung
- Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfung
- Nachholimpfung (Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie.)

<sup>1</sup> 6 Monate Mindestabstand zur 2. Impfung

<sup>2</sup> ab vollendetem 12. Monat

<sup>3</sup> Standardimpfung mit 2 Dosen für Jungen und Mädchen von 9 bis 14 Jahren, bei Nachholen der Impfung mit 3 Dosen

# HINWEISE ZUM IMPFKALENDER

## Kombinationsimpfstoffe

Durch die Anwendung von Kombinationsimpfstoffen kann die Anzahl der Injektionen gering gehalten werden.

## Fehlende Impfungen

Fehlende Impfungen sollten sofort – entsprechend den Empfehlungen für das jeweilige Lebensalter – nachgeholt werden.

## Impfkalender in mehreren Sprachen

Der aktuelle Impfkalender der Ständigen Impfkommission (STIKO) ist in mehreren Sprachen auf [www.rki.de](http://www.rki.de) veröffentlicht.



## Erläuterung zur RSV-Impfung

Hinzugekommen ist im Impfkalender der STIKO die Impfung gegen das Respiratorische Syncytial Virus, auch als RSV bekannt. Hier soll eine Einmaldosis gegeben werden. Der Zeitpunkt der Impfung ist abhängig vom Geburtsmonat des Kindes. Kinder, die zwischen April und September geboren werden, sollen ihre Impfung mit Nirsevimab im Herbst erhalten, also quasi vor der ersten RSV-Saison. Neugeborene, die während der RSV-Saison, also von Oktober bis März geboren werden, sollen ihre Impfung möglichst rasch nach der Geburt erhalten, idealerweise bei der Entlassung aus der Geburtseinrichtung.



**Kreis Coesfeld - Der Landrat**  
**Untere Gesundheitsbehörde**  
**Schützenwall 16 - 48653 Coesfeld**  
**Tel. 02541 / 18-0 - Fax 02541 / 18-9999**

© Kreis Coesfeld, Februar 2025  
Foto Titel: VRD / Robert Kneschke / contrastwerkstatt / yanlev - fotolia.com - stock.adobe.com